

BERUFSKRANKHEITEN DES ZAHNARZTES



INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der zahnärztlichen Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität

zu Bonn.

Vorgelegt am 14. Dezember 1936.

von

Werner Schulz

Zahnarzt

aus Bonn.

Anton Brand
Bonn 1937.

Gedruckt
mit Genehmigung der medizinischen Fakultät der
Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Graff
Korreferent: Prof. Dr. Selter



Dem Andenken meines Vaters!



INHALT.

1. Schädigungen der Haut.
2. Schädigungen des Bewegungsapparates.
3. Quecksilberschädigungen.
4. Röntgensschädigungen.
5. Schädigungen des Nervensystems.
6. Schädigungen durch Syphilis.
7. Schädigungen des Auges.
8. Panaritien.
9. Schrifttum.

Wie jeder Beruf, so hat auch der zahnärztliche Beruf unter Schädlichkeiten zu leiden, die durch den Beruf bedingt und eng damit verknüpft sind. Diese Schädlichkeiten können so groß sein, daß eine Aufgabe des Berufes manchmal unumgänglich ist. Verhindern kann man diese Schädlichkeiten vielleicht nicht immer, aber den Versuch, es zu tun, kann man durch eine frühzeitige Prophylaxe immer machen, wenn man über die Art und Ursache der Schädlichkeit unterrichtet ist.

B. Klein stellte bei einer Rundfrage fest, daß von 140 Zahnärzten nur 17% ohne irgendwelche Beschwerden und Schädigungen beruflicher Art waren. Allein 72 Zahnärzte klagten über neurosthenische Beschwerden. Brunft hat das Durchschnittsalter der Zahnärzte mit $55\frac{1}{2}$ Jahren berechnet. Petermann berechnete das Durchschnittslebensalter der Zahnärzte auf 59 Jahre, 5 Monate und 15 Tage.

Löwy, Conrad führen an, daß bei einem Vergleich des Sterblichkeitsverhältnisses der verschiedenen Berufe, Ärzte und Zahnärzte in den akademischen Berufen am frühesten starben.

Zwei Faktoren sind es, die sich im Berufsleben auf die Morbiditäts- und Mortalitätsziffern auswirken.

1. Der Einfluß auf die soziale Lage, die sich durch die Forderungen der Kassenpraxis sehr verschlechtert hat.
2. Die Berufseigentümlichkeiten und Berufsgefahren.

Wenn auch diesen Berufsgefahren im allgemeinen die vollständige Lebensschädigung fehlt — die deutschen Lebensversicherungsgesellschaften gliedern den zahnärztlichen Beruf bei 12 Gefahrenklassen, wobei Nr. 12 die größte Gefahrenklasse darstellt, in die vierte Gefahrenklasse ein, — so weiß man anderseits doch, daß eine Berufsbehinderung, z. T. in großem Maße, nicht hinweg zu leugnen ist. Es sind immer nur Teile des Gesamtorganismus, die durch die Schädlichkeiten ausfallen, aber diese ziehen wieder andere Teile des Organismus in Mitleidenschaft, so, daß das volle Ausnützen der

Arbeitskraft nicht möglich ist und somit zum zeitweiligen Aussetzen der Arbeit zwingt.

Man kann nach Heinrich 2 Gruppen von Schädlichkeiten annehmen:

1. Diejenigen, die uns durch die Patienten und durch die Medikamente und Apparate zugefügt werden. Hierzu gehören die Bißverletzungen, die Ansteckungen sowie die Röntgen- und Quecksilberschädigungen.
2. Die anderen körperlichen Schädigungen, zumeist bedingt durch Überanspruchung bzw. durch fehlerhafte Haltung des Körpers.

Schädlichkeiten der Haut.

Die Schädlichkeit der Haut, das Ekzem, spielt als Berufskrankheit der Zahnärzte eine bemerkenswerte Rolle. Wohl jeder Zahnarzt ist mit dem Ekzem schon in mittelbare oder unmittelbare Berührung gekommen, und es hat schon manchem Zahnärzte die Arbeitsfreude genommen.

Vorbedingung für die Entstehung eines Ekzems ist die Disposition, die entweder angeboren oder erworben sein kann. Beim Zahnärzteekzem ist sie wohl meist erworben. Deswegen kommt es auch vor, daß mancher 20 Jahre lang keine Schädlichkeit an seinen Fingern beobachtet hat, dann aber das Ekzem ohne sichtbaren, äußeren Grund aufflammt. J a d a s s o h n , B l o c h u. a. verdanken wir die Erkenntnis, daß das Ekzem eine allergische Krankheit ist und demzufolge durch Einwirkung exogener Noxen entsteht. Es besteht eine spezifische Überempfindlichkeit oder „Sensibilisierung“. Diese Sensibilisierung kann auf verschiedenen Wegen vor sich gehen. J a d a s s o h n führt folgende Möglichkeiten an:

1. Von außen an die Haut herantretende Reize führen zu einer Sensibilisierung gegen wiederum von außen herantretende Reize.
2. Gibt es eine Sensibilisierung von innen gegen von innen herantretende Reize.
3. Von innen gegen von außen.

4. Von außen gegen von innen.

Unter Sensibilisierung versteht man also die Steigerung der Empfindlichkeit der Haut durch eine bestimmte Einwirkung, und zwar kann diese Empfindlichkeit nur gegen dieselbe oder auch gegen mehrere Einwirkungen vorhanden sein.

Sachs macht den Ausbruch eines Ekzems noch abhängig von der Dauer der Einwirkung auf die Haut und von der Reizstärke. Charakteristisch für das Ekzem ist der starke Juckreiz, sowie das oft schubweise Auftreten und die flächenhafte Ausbreitung. Außerdem die starke Neigung zu Rezidiven und ferner das Freibleiben der Schleimhäute.

Über das klinische Bild sind die verschiedensten Angaben vorhanden. Der eine Autor erwähnt Verdickungen der Fingerbeeren, Rhagadenbildung, Einrisse am Nagelfalz, der andere berichtet von Bläschenbildung an den Arbeitsfingern, die sich am Handrücken und sogar im Gesicht konstituieren.

Alle aber haben quälenden Juckreiz, der zum Kratzen verführt.

Diffuse Rötung und Bläscheneruption an der Streckseite der Finger der Arbeitshand, — die Eruptionen können sich auch vornehmlich interdigital erstrecken — herrschen in den Anfangsstadien vor. Durch Exazerbation und Konfluenz schreitet die Krankheit fort, bis durch Zerstörung der Cutis, unterstützt durch Kratzeffekte, einer Infektion Tür und Tor geöffnet ist, und wir geschwürige Flecken mit eingeschlossenen, subcutanen Abzessen vorfinden. Das typische klinische Bild und Verlauf des Ekzems ist folgendermaßen: Es beginnt mit der Bildung entzündlicher Flecken: Ekzema erythematosum, sodann bilden sich kleine Knötchen: Ekzema papulosum. Aufschießen von kleinen Bläschen: Ekzema vesiculosum; ist der Bläscheninhalt von Leukozyten infiltriert, so spricht man von einem pustulösen Ekzem: Ekzema pustulosum. Beim Platzen dieser Bläschen entstehen daraus nässende Stellen: Ekzema madidans. Wenn die ausgeschiedene Flüssigkeit eintrocknet, entsteht ein krustöses Ekzem: Ekzema crustosum. Ist letzteres von einer Sekundärinfektion durch pyogene Kokken begleitet, so be-

zeichnet man es als: Ekzema impetiginosum. Kommt es bei der Abheilung zur Schuppenbildung, so reden wir von einem Ekzema squamosum. Zwischen den aufgezählten Hauptformen finden sich natürlich zahlreiche Übergänge und Kombinationen.

v. W u r m b charakterisiert die gewerblichen Dermatosen als diejenigen Hautaffektionen, die auf die spezifische Beschäftigung als ausschlaggebende Ursache zurückzuführen sind. Kennzeichnend ist ferner für die gewerbliche Dermatose, daß infolge der beruflichen Ursache die Schädigung in der Regel dauernd oder doch zu wiederholten Malen auf die Haut einwirkt.

Welche Stoffe können nun beim Zahnarzt ein Ekzem hervorrufen?

Man kann wohl sagen, daß es alle Stoffe sein können, mit denen der Zahnarzt in Berührung kommt. Immer wieder werden uns neue Substanzen bekannt, die ekzematogen wirken. Die durch diese Stoffe bedingten Reize sind ausschließlich chemischer Natur und zwar sind unter der großen Zahl der in der Zahnheilkunde verwendeten Medikamente bzw. Chemikalien einige als ganz besonders ekzematogen wirkend bekannt, z. B. Formalin und Novocain. Da nach der modernen Auffassung über das Ekzem die Natur des Antigens das klinische Bild in keiner Weise beeinflusst, d. h. ihm keine individuelle Prägung verleiht, so wird es in jedem Falle von Berufssekzem nötig sein, immer wieder von neuem aus der großen Zahl der die Haut treffenden Noxen den ursächlichen Faktor herauszufinden und zu entfernen. Daher ist es nicht möglich, besonders in Anbetracht dessen, daß fast täglich neue Arzneien und Chemikalien in die zahnärztliche Praxis eingeführt werden, alle in Frage kommenden Noxen aufzuzeichnen und sollen im Folgenden nur einige Noxen, die hauptsächlich als Ursache festgestellt wurden, erwähnt werden. v. D e i n s e z. B. berichtet von einem Ekzem an den eigenen Fingern, das er auf den Alkohol, in dem er seine Injektionspritze aufzuwahren pflegte, zurückführt.

M i s c h glaubt an die Möglichkeit, daß ein Ekzem durch die dauernde Berührung mit dem Speichel entstehen könne.

Auch ist es möglich, daß ein Ekzem auf rein mechanischer Basis entsteht, und zwar dadurch, daß der Zahnarzt genötigt ist, seine Hände auf das Intensivste mit der Nagelbürste und dem Nagelreiniger zu reinigen.

Die hauptsächlichsten Urheber des zahnärztlichen Ekzems scheinen aber Novocain, Sublimat bzw. metallisches Quecksilber sowie Formalin und Trikresolformalin zu sein. In früherer Zeit fand man häufig noch Arsen in Gestalt der arsenigen Säure, das zum Abätzen der Pulpa verwandt wurde.

Novocain wird in der Zahnheilkunde als Lokalanästhetikum benutzt. Chemisch gehört es zu den Körpern der Orthoformreihe, die basische Ester der Benzoesäure bzw. Oxybenzoesäure darstellen. Novocain selbst ist löslich und daher zur Injektion geeignet, während die anderen Vertreter der Orthoformreihe unlöslich sind.

Zuerst in Amerika wurde man auf den ekzematösen Charakter des Novocain aufmerksam. Lane berichtet über drei Ekzemfälle bei Zahnärzten. Da alle Patienten schon längere Zeit ohne irgend welchen Schaden dieses Präparat in ihrer Praxis benutzt hatten, glaubt Lane an eine allmähliche Sensibilisierung. Klinisch äußerte sich das Ekzem in Schuppen und Rhagadenbildung. Smelow führt das Ekzem einer 47jährigen Zahnärztin als Beweis an; diese war 14 Jahre im Beruf tätig. Seitdem sie Novocain verwandte, bekam sie Schmerzen an den Fingern, besonders an den Stellen, wohin die Novocaintropfen drangen. Besonders um die Fingernägel herum entstand Rötung und Hyperkeratosenbildung. Wenn die Arbeit ausgesetzt wurde, gingen die Erscheinungen etwas zurück, schwanden aber nie ganz.

Carreras spricht von einem 35jährigen Dentisten. Es zeigte sich ein papulovesikulärer Ausschlag an fast allen Fingern beider Hände, besonders aber in der Umgebung der Fingernägel. Der Ausschlag infizierte sich sekundär, heilte bei Behandlung nicht ab, sondern nahm verrukösen Charakter an. Nach Schutz der Hände bei der Arbeit wurde Heilung erzielt.

Jordan berichtet über drei selbst behandelte Fälle von Novocainekzem bei Zahnärzten.

Im ersten Fall kam eine junge Zahnärztin in J o r d a n s Behandlung wegen eines Ekzems, das sich in Induration der Haut und stark schmerzender Rhagadenbildung an den Spitzen der drei ersten Finger beider Hände zeigte. Die Patientin war unglücklich darüber, weil sie zeitweilig ihre Stellung wegen Arbeitsunfähigkeit aufgeben mußte und fürchtete, schließlich ihren Beruf wechseln zu müssen. Durch Fragen stellte J o r d a n fest, daß die Patientin viel mit Novocainlösungen in Berührung kam. Auf seinen Rat arbeitete die Zahnärztin nicht mehr mit Novocain, worauf der Prozeß bald abheilte.

Der andere Fall war bei einem 42jährigen Zahnarzte, und der dritte Fall sogar bei einem 62jährigen Zahnarzte, der 35 Jahre seine Praxis ausübte. Er litt seit einem Jahre erst an einem Hautausschlag, der alle Finger bis auf die kleinen Finger beider Hände befallen hatte. Es fand sich eine starke Verdickung der Haut an der Beugeseite der Endglieder; außerdem waren Rötung, Schuppung und schmerzende Rhagaden vorhanden. Die Nägel waren vorn emporgehoben und an der Oberfläche mit Furchen und weißen Flecken versehen. Auf der Streckseite der Finger war die Haut stark gerunzelt, faltig und atrophiert. J o r d a n stellte fest, daß der Patient seit $1\frac{1}{2}$ Jahren Novocain zu Zahnextraktionen gebrauchte und daß das Ekzem zum ersten Male vor einem Jahre aufgetreten sei. J o r d a n verordnete Aussetzung der Novocaininjektionen und indifferente Salbenbehandlung, worauf das Ekzem bald abheilte.

Die besonderen Merkmale des Novocainekzems sind wohl hauptsächlich, daß das Ekzem stets zuerst an dem 2. und 3. Finger der linken Hand und dem 1. und 3. Finger der rechten Hand entsteht. Dies erklärt sich wohl daraus, daß mit den linken Fingern die Ampulle und mit den rechten Fingern die Spritze gehalten wird. Es zeigen sich ferner Risse und Hautverdickungen und Absplittierung der Haut der Fingerkuppen. Die Heilung erfolgt entweder in Fortlassen des Präparates aus der Praxis, oder durch Tragen von Handschuhen beim injizieren, so, daß jede Möglichkeit, mit Novocain in Berührung zu kommen, vermieden wird.

Quecksilber.

Befonders gerne entsteht dieses Ekzem, wenn die Hände mit einer normalen, also für die Hände fettarmen Seife gewaschen werden und dann mit Sublimat in Berührung kommen. Der Alkaligehalt der normalen Seife verursacht Fettverarmung der Haut, so, daß sie rissig wird und damit einen locus minoris resistentiae für das in diese Risse eindringende Sublimat abgibt. Bei diesem Sublimat-ekzem ist am charakteristischsten das sich bietende Bild der Nägel: Glanzlose, rauhe Nagelplatten, die brüchig werden und dadurch splintern. Das Ekzem beginnt wie jedes andere als Ekzema erythematosum bzw. papulosum, durchläuft alle Stufen und endet als Ekzema squamosum. Man kann unter Umständen an einer Hand alle diese Stadien nebeneinander ablaufen sehen. Beim akuten Ekzem kann es dann vorkommen, daß ein Stadium teilweise übersprungen wird. Beim chronischen Sublimatekzem endet es meist mit einer Verdickung der Haut, ohne aber seinen Ekzemcharakter zu verlieren.

Klein sah drei Fälle von Quecksilberekzem dadurch entstehen, daß die Zahnärzte das Quecksilber mit der Hand verrieben und dann das überschüssige Quecksilber mit der Hand auspreßten.

Tholuk erwähnt noch ein Ekzem des Fußes, daß durch Einatmen von Quecksilberdampf entsteht. Da sich eine Schädlichkeit stets an einem locus minoris resistentiae einstellt, z. B. bei defolatem Gebisse als Stomatitis mercurialis, ist im Falle des Zahnarztes der Fuß der Ort der Einwirkung. Es stellt sich eine chron. Hyperhydrosis der Füße ein. Festzustellen ist sie vor allen Dingen dann, wenn nebenher noch eine Quecksilberausscheidung im Harn nachzuweisen ist.

Formalin.

Eins der hartnäckigsten Ekzeme ist das Formalinekzem. Die Idiosynkrasie kann derartig gesteigert sein, daß, wie in einem von Klöfer angeführten Falle, schon das Öffnen einer kleinen Trikräsolformalinflasche Brennen im Gesicht, an der Fußsohle und Händen bewirkte und es zum Ausbruch eines Ekzems kam.

Das Formalin wird in der Zahnheilkunde als Desinfektionsmittel in Form der 35%igen Formaldehydlösung oder als 10%ige Formaldehydkalifeisenlösung, die unter dem Namen „Lysoform“ sich im Handel befindet, benutzt. Ferner findet es als Trikresolformalin in der Wurzelbehandlung der Zähne sowie in Form von Wurzelpasten, als auch zu antiseptischen Einlagen bei der Gangränbehandlung, Verwendung. In der letzten Zeit wird auch fein in der Hitze entstehendes Polymerisationsprodukt „Paraldehyd“ als Devitalisationsmittel an Stelle von Arsen verwandt. Das Formaldehyd gehört chemisch zu den Methanderivaten und ist als Aldehyd der Ameisensäure aufzufassen.

Über das Formalinekzem berichtete als erster eingehender *Wolters*. Er fand als typischen Sitz dieser Dermatose die Endphalangen der Finger, besonders in der Umgebung der Nägel.

Galewski beschreibt die dabei an den Nägeln besonders sichtbare Reaktion. Zuerst bräunliche Verfärbung an den Nägeln, sodann allmähliche Erweichung und Auffaserung der Substanz. Es kommt zu einer sehr schmerzhaften Zerstörung des Nagelfalzes.

Wolters glaubt die Entstehung des Formalinekzems auf das häufige Händewaschen mit Desinfektionsmitteln und die Bearbeitung des Nagelfalzes und der Nagelwälle mittels Reiniger und Bürste zurückführen zu können. Da dem Formalin eine austrocknende Wirkung zukommt, das Epithel dadurch rissig wird und somit doppelt geschwächt für jegliche Art von Reizen ist, so entstehen Blasen und Risse sowie Schwellung der Haut und Verkümmern der Nägel. *Hölzer* beschreibt ein Formalinekzem, das er selbst hatte und ihn zum zeitweiligen Aussetzen in seinem Berufe zwang. Er glaubt die Entstehung dieses Übels in der Angewohnheit zu sehen, mit dem Finger die mit Trikresolformalin getränkte Watte von der Millernadel abzustreifen.

Kopytowski hat nähere Untersuchungen über die pathologischen Veränderungen der Haut bei Formalineinwirkung angestellt. Er fand, daß die Veränderungen gleicher Art waren, ob sie nun von 1%iger oder 20%iger Formalinlösung verursacht waren. Histologisch war der Papillarkörper und die Cutis von einer mäßi-

gen Zahl von Leukozyten infiltriert. Makroskopisch war die Haut gerötet, oedemtös geschwollen und mit Schuppen bedeckt. Dazu bestand der für das Ekzem typische Juckreiz. Er glaubt über die Wirkungsweise des Formalins sagen zu können, daß es sowohl hyper- und parakeratotisch, schwach leukozytotaktisch, auf das Pigment chromotaktisch wirkt.

Klein schätzt die Verbreitung dieses Ekzems unter den Zahnärzten auf 9,5 %, jedoch dürfte diese Zahl eher etwas zu niedrig als zu hoch geschätzt sein, da dieses Ekzem wohl weiter verbreitet ist, als man allgemein annimmt und bekannt ist. Diese Ekzeme können sich bis zur Urtikaria steigern und auch nach Vermeiden des schädigenden Mittels kann es noch sehr lange dauern, bis die Hautaffektion verschwunden ist.

Arfen.

Das Arfenekzem durch arsenige Säure dürfte heute wohl der Vergangenheit angehören, da durch die Hollundermarkkügelchen eine nähere manuelle Berührung mit dem Arfen wegfällt resp. vielfach schon arsenfreie Pasten zum Abätzen der Zahnpulpa verwandt werden. Früher jedoch stellte man sich die zum Abätzen nötige Menge selbst her und kam dadurch in nähere Berührung mit dem Arfen.

v. Wurm b schildert das charakteristische Bild eines solchen Arfenekzems. Es beginnt unter den Nagelspitzen mit Eiterbildung. Die Nägel heben sich später vom Nagelbett ab. Die Haut wird mit ergriffen, Bläschen mit geröteter und geschwollener Umgebung entstehen. Man spricht bei einem solchen Ekzem auch vielfach vom Arsenzoster oder Arfenpempfigus. Begleitet ist diese Hautaffektion von starken, neuralgiformen Beschwerden. Die Bläschen heilen unter Krustenbildung ab. Ferner kann noch eine fogen. Arsenkeratose entstehen. Es kommt dabei zu einer schwieligen Verdickung der flachen Hand mit mächtigen, lederartigen Auflagerungen. Diese Auflagerungen sind an den Rändern gerötet und äußerst schmerzhaft. Hinzu kann noch eine Entzündung der Schwielen kommen, so, daß ein Arbeiten auch mit Handschuhen unmöglich ist.

Wie schon gesagt, können auch alle anderen Materialien ein Ekzem hervorrufen. Brähler berichtet von einem Ekzem, hervorgerufen durch den Entwickler der Röntgenfilme. Es begann mit leichtem Schuppigwerden der Haut des Mittel- und Ringfingers und steigerte sich bei Verdickung und Verhärtung der Haut bis zur pergamentartigen Beschaffenheit. Dazu kam, wie meist noch, der heftige Juckreiz. Brähler hielt jedoch eine Beteiligung von Formalin für nicht ganz ausgeschlossen. Es besteht also die Möglichkeit, daß der Entwickler als scharfe Chemikalie den locus minoris resistentiae für die Formalineinwirkung abgab. Auch ich litt an einem sehr hartnäckigen Ekzem unbekannter Aetiologie. Als auslösender Stoff stellte sich nachher die Kernseife heraus. Während der Studienzeit stand uns zum Händewaschen Kernseife zur Verfügung. Als Assistent der Chirurg. Abteilung derselben Klinik war ich später genötigt, mir die Hände auf das Intensivste zu waschen und zu bürsten. Als Seife stand ebenfalls nur Kernseife zur Verfügung. Während dieser Zeit trat das Ekzem in Erscheinung. Zwischen und auf den Fingern traten kleine Bläschen auf, die nach einer Woche entweder eintrockneten, wobei sich die Haut abschuppte, oder die Bläschen platzten auf, um längere Zeit ein wässeriges Sekret abzufondern. Diese Bläscheneruptionen breiteten sich über die ganze Hand aus. Sie verschwanden ganz, als ich die Klinik verließ und eine Arbeitsstätte fand, wo Kernseife nicht benutzt wurde. Da auch erst erkannte ich die Ursache des Ekzems. Bin ich heute genötigt, einmal Kernseife zu benutzen, kann ich sicher sein, nach 1 bis 2 Tagen Bläschen an meinen Fingern vorzufinden.

Diese durch irgendein spezifisches Reagenz hervorgerufenen Ekzeme unterscheiden sich meist gar nicht von einem unspezifischen Ekzem, worin auch die Schwierigkeit zu erblicken ist, das das Ekzem bewirkende Mittel zu diagnostizieren.

Die Therapie, die stets Heilung bringt, besteht im Fortlassen des das Ekzem auslösenden Medikamentes oder, wenn dies nicht immer möglich ist, z. B. bei der Novokainidiosynkrasie, im Anziehen von Gummihandschuhen und peinlichstem Vermeiden einer Berührung mit Novokain.

Klöfer glaubt bei einer Trikresolformalindermatitis durch Röntgenbestrahlung schnell und sicher helfen zu können. 3—4 Bestrahlungen $\frac{1}{5}$ — $\frac{2}{5}$ HED in Abständen von 8—10 Tagen. Zwischen- durch feuchte Kompressen mit alc. absol. + Salicylsäure. Zink-Wismut zum Erweichen der Krusten. Wenn nur noch Infiltrate und Schuppen vorhanden, kommt Steinkohlenteer zur Anwendung in Form von solutio lithantracis acetonica oder Liquor carb. detergens. Sodann längerer Urlaub und selbstverständlich Fortlassen aller formalinhaltigen Substanzen.

Bei Anfragen der Zahnärzte in den Fachzeitschriften über die Therapie der Ekzeme wird alles angegeben, was bereits einem Zahnarzte in solch einem Falle geholfen hat. Selbst Waschungen mit Perfol, das die Haut noch mehr reizt und schädigt, bis zur Aspirinkur wird alles empfohlen. Unter anderem wird eine Umstimmung der ganzen Ernährungsweise vorgeschlagen. Bonne z. B. rät zu einer lakto-vegetabilischen Kost. Wieder andere empfehlen Salben, z. B. LPC Lupocid, die die Haut schält, von der Erwägung ausgehend, daß auch die überempfindlichen und deshalb untauglichen tieferen Gewebsschichten abgestoßen werden müssen. Stets sind es Angaben, die in dem einen Falle sicher schon mal geholfen haben, jedoch nicht in jedem Falle zu helfen brauchen. Daran erkennt man ebenso, daß jedes Ekzem individuell zu behandeln ist. Ein einziges Hilfsmittel gibt es immer: Solange das Ekzem besteht, das Vermeiden von Wasser und der auslösenden Ursache.

Schädigungen des Bewegungsapparates.

Durch Übermaß der Tätigkeit kommt es zu einer Beeinflussung der funktionsausübenden Körperteile. Charakteristisch für diese Erkrankungen ist, daß die Beschwerden nur bei einer ganz bestimmten Tätigkeit auftreten, während andere Betätigungen derselben Muskelgruppe ohne Beschwerden ausgeführt werden können.

Mosenthal spricht von den statischen Erkrankungen des Körperstammes, wobei in erster Linie die Gelenke betroffen sind. Unter statischen Gelenkleiden versteht man die Erkrankung, die ein Gelenk durch falsche Belastung oder Überbelastung erfährt. Von

dem betroffenen Gelenke oder Knochen leitet sie sich auf alle Gelenke und Knochen der befallenen Extremität aus, weil jede Extremität eine statische Einheit bildet. Diese Störungen wirken sich ferner auch auf die Muskeln und Bänder der Extremitäten aus.

Muskelkrämpfe kommen vor an den Flexoren des Daumens und Zeigefingers durch den dauernden Gebrauch von Instrumenten, die einen zu dünnen Griff haben. *Plat e* spricht von einer Myalgie des *Musculus latissimus Dorsi* rechts und führt dazu aus:

Es ist äußerst wichtig, daß die Hand feinste Bewegungen mit größter Sicherheit ausführt. Das ist nur möglich, wenn die Basis, auf die sich die Hand bei der Ausführung dieser Bewegung stützt, in diesem Falle also der Arm, denkbar steht steht. Es muß also das Schultergelenk dauernd fest fixiert werden. Hierdurch entsteht allmählich eine große Schmerzhaftigkeit der Ansatzstelle des *musculus latissimus dorsi* am Humerus. Wird beim Erheben des Armes dieser Muskel gedehnt, so entstehen wohl infolge der Schmerzhaftigkeit heftige Kontrakturen in denselben. Daß es im wesentlichen Spasmen sind, die hier die beträchtlichen Bewegungsstörungen verursachen, erkennt man am besten daraus, daß im warmen Bade, wenn die Spasmen nachlassen, eine weit höhere Beweglichkeit im Gelenk eintritt.

Mosenthal erwähnt eine andere Erkrankung, die *Epicondylitis*, deren Sitz der *Epicondylus medialis* des Oberarmknochen an der Daumenseite des Ellenbogengelenkes ist. Durch die ständige Haltung der Hand des Zahnarztes in Abduction und Dorsalflexion bei der Bedienung des Bohrers werden die Muskeln, die bei dieser Stellung beansprucht werden, in ständiger Spannung gehalten. Diese Muskeln sind der allgemeine Handstrecker und der radiale und ulnare Rückwärtsstrecker der Hand. Alle diese entspringen von einer gemeinsamen Stelle am *Epicondylus* des Oberarmes. Sie erzeugen durch die Überanspruchnahme eine Entzündung des Schleimbeutels, der zwischen den Sehnen und der Knochenhaut liegt. An der Knochenhaut geht die Entzündung weiter und verursacht bei weiter fortgeschrittenem Leiden eine Schwellung, die allmählich in eine kleine Knochenvorwölbung übergeht. In fortgeschrittenen Stadien kann es soweit kommen, daß der Knochenvorprung ab-

gemeißelt werden muß. Schwerer jedoch sind die Schädigungen der unteren Extremitäten. Es herrschen hier insbesondere die Plattfußbeschwerden vor. Bei schon vorhandener Anlage zu Plattfüßen oder großem Körpergewichte wirkt die ständige Arbeit im Stehen sicher auslösend. Klein fand bei 140 Zahnärzten 33% mit Plattfüßen.

Nach F a u s t wird das Gewölbe des Fußes durch zwei Faktoren aufrechterhalten. Einmal durch die bindegewebigen Ligamente, welche die einzelnen Fußknochen miteinander verbinden und ferner durch die Kraft der Muskeln, welche an der Wade sitzen und von dort mit ihren langen, schlanken Sehnen hinter dem inneren Knöchel hinab zur Fußsohle ziehen und dort ansetzen. Ziehen sich diese Muskeln zusammen, so wird der innere Fußrand gehoben und das Fußgewölbe erhöht sich soviel, daß die Ligamente entlastet werden und somit das Fußgewölbe aktiv hochgehalten wird. Normalerweise sind nun die Haltebänder und Muskeln so kräftig, daß das Fußgewölbe den Körper mit seiner Last ohne jede Gefahr der Einsenkung trägt. Nimmt aber deren Kraft ab und gar noch das Körpergewicht zu, dann tritt folgendes ein: Zunächst ermüden die Muskeln, sie tun ihre Schuldigkeit nicht mehr und überlassen das Tragen der Körperlast allein den Haltebändern. Da aber die gleichen Ursachen, die zur Schwächung der Muskeln führen — Nachlassen der allgemeinen Körperkraft aus allen möglichen Gründen — auch die Haltebänder des Fußgewölbes mitschädigen, so werden auch diese insuffizient und geben allmählich dem Gewichte des Körpers nach. Hinzu kommt noch die falsche Form des heutigen Schuhs. Die größte Länge des Fußes liegt an der größten bzw. 2. Zehe, während die übrigen Zehen schräg nach außen abfallen. Der heutige Strumpf und Schuh haben ihre größte Länge in der Mitte. Die Zehen müssen sich dieser starren Form angleichen und verändern ihre Stellung von der geraden zur Schrägstellung zur Mitte hin. Gleichzeitig drückt die nach oben gerichtete Spitze des Schuhs die Zehen auch nach aufwärts. Durch diese dauernde Behinderung sind die Zehen fixiert und somit von der Belastung ausgeschaltet. Der Stützpunkt des Fußes wird nun beim dauernden Stehen, vergrößert noch durch den Druck, den man beim Arbeiten vom Boden empfängt, um stärker an dem Objekt

feiner Behandlung wirken zu können, nach vorne und außen abgedrängt. Die Fußfläche dreht sich nun flach nach außen, und der Fuß wird im Gelenk um seine sagittale Achse gedreht. Die Tibia kommt zur Knickstellung und ferner zu einer Ermüdung des beteiligten Muskels und Bandapparates. Dieses entzündliche Plattfußleiden wird dadurch verstärkt, daß durch die Verringerung der Unterstützungsfläche des Fußes die Senkung und Umlegung des Plattfußes beschleunigt wird und durch die wechselseitige Schrumpfung und Lockerung der Bänder es dann zum fixierten Plattfuß kommt. Besonders am rechten Fuße kommt es zur Tibiaknickung, bedingt durch die nach rechts gebeugte Haltung beim Arbeiten am Patienten. Um möglichst nahe am Patienten zu sein, wird der rechte Fuß nach außen gedreht und das Körpergewicht auf den Fußinnenrand verlegt.

Ferner kommt es bei der Arbeit im Stehen zum Brennen an den Fußsohlen, Druck und Berührungsschmerz an den Hacken, Schwielen an den Fußrändern und Schwellung der Fuß- und Zehengelenke. Ferner zur Müdigkeit in den Knien bis hinauf zu den Rückenpartien. Es kann zum Hexenschuß kommen, der in einer schmerzhaften Alteration, Steigerung der Nervenempfindlichkeit und langwieriger Fixierung der Kreuzmuskulatur besteht.

Um den Druck vom Boden beim Arbeiten zu schwächen, benutzt man vielfach Gummimatten, und zwar mit rauhen Mustern, um den Fuß nicht ausrutschen zu lassen.

Prophylaktisch ist wohl am besten die Umstellung von der stehenden zur sitzenden Arbeitsweise, bzw. ein Wechsel zwischen diesen beiden Arbeitsweisen. Zu diesem Zwecke stehen verschiedene Stühle, z. B. von Balzers usw. zur Verfügung. Therapeutisch ist bei eingefunkenem Fuße mit Einlagen nur bei längerem, dauerndem Tragen eine Besserung zu erhoffen. Da ja der fixierte Plattfuß nicht mehr schmerzhaft ist, wird meist auf die Einlage ganz verzichtet.

Verstärkt werden diese Schädlichkeiten am Bewegungsapparat durch Zirkulationsstörungen. Durch das dauernde, aufrechte Arbeiten fehlt dem venösen Blute, um zum Herzen hinfließen zu können, die unterstützende Muskelkontraktur. Die anfangende

Kraft des Herzens und der Lunge und geringe Muskelbewegung der Venenwände genügen nicht, um die Wirkung der Schwere, die dem Rückfluß des Blutes entgegensteht, zu überwinden. Die Beinvenen müssen ein Mehr von Blut aufnehmen, die Wände dehnen sich, verlieren ihre Kontraktilität, es kommt zur Insuffizienz der Klappen und damit zur Bildung von Varizen, an die sich meist eine ödematöse Durchtränkung des Gewebes anschließt.

Eine weitere große Rolle spielt auch die Körperhaltung selbst. Der Zahnarzt verrichtet seine Arbeit mit gebeugtem Kopfe, meist die rechte Schulter nach vorne geschoben, die linke Schulter erhoben, die linke Hand über dem Kopfe des Patienten. Dabei steht der Zahnarzt in der Regel mit seitlich abgelenktem Oberkörper nach der rechten Seite abgelenkt. In dieser Haltung belastet er seine unteren Extremitäten falsch, indem der Schwerpunkt, der normalerweise in die Mitte zwischen beide Füße fällt, nach außen verschoben wird. Beim Arbeiten mit der Bohrmaschine steht der Zahnarzt meist auf dem linken Fuße, während der rechte Fuß den Schalter der Maschine betätigt. Das ganze Körpergewicht ruht auf dem linken Fuße, dieser überträgt das Gegengewicht auf den Schenkel, das Knie wird nach innen durchgedrückt oder nach hinten überspannt. Es kommt zur Arthritis deformans des Knies. Der Oberschenkelknopf in der Pfanne (Hüfte) und die gesamte Beckenmuskulatur wird nach oben verschoben. Dies bedingt eine Wirbelsäulenverkrümmung und somit eine Sekundärerkrankung des Herzens.

Herz schreibt von dieser Form der Herzmuskelschädigung: Wenn wir einen Querschnitt durch den Thorax in der Höhe der Mamilla betrachten, so finden wir, daß derselbe ein nierenförmiges Aussehen besitzt. Der kleinste Durchmesser dieses Raumes befindet sich zwischen Wirbelsäule und Brustbein. Dort besteht ein Engpaß. Das Herz wird bei Thoraxdeformitäten zunächst in der Richtung des größten Durchmessers ausweichen, und sich nach links verschieben, damit es nicht mit seinem größten Durchmesser im Isthmus steht. Dann kommt es zur unvermeidlichen Breitquetschung desselben, die sich subjektiv bemerkbar macht in Schwächezuständen

und leichten Ohnmachtsanfällen und objektiv in vergrößerter Herzdämpfung, Pulsunregelmäßigkeiten, resistentem Spitzenstoß sowie in unökonomischer Herzarbeit, da ein größerer Teil des Herzens durch die elastische Thoraxwand komprimiert wird. Es leidet hierdurch in erster Linie die Saugkraft der Ventrikel und da durch die mechanische Oppression auch der Coronarkreislauf tangiert werden kann, so findet man myokarditische Veränderungen an Vorder- und Hinterwand des Herzens, wo der Druckaufwand am stärksten gewesen sein muß.

Herzmuskeldegeneration ist ferner bedingt durch mangelnde körperliche Betätigung und einer unrationellen Ernährung. Zur Anämie kann es durch die kohlenfäurereiche, phenol- und quecksilberhaltige Luft in den Praxisräumen kommen.

Arteriosklerose findet man häufig bei Zahnärzten im Alter. Sie entsteht auf dem Boden von mechanischen und infektiöstoxischen Momenten, die alle beide im zahnärztlichen Beruf gegeben sind. Die Diagnose wird gesichert durch das Fehlen des Pulses auf dem Fußrücken (Art. dorsalis pedis) und hinter dem Knöchel (Art. tibialis posterior).

Quecksilberfchädigungen.

Nach Borinski nimmt der Mensch täglich bis 10 gamma Quecksilber zu sich. Diese unschädliche Menge kommt vor in der Nahrung, besonders im Graubrot und in den Früchten.

Bei einem Zahnarzt, der Quecksilber verarbeitet, muß man natürlich mit größeren Mengen rechnen. Es besteht einmal die Möglichkeit, daß durch das Verreiben des Quecksilbers in der Hand dieses durch die Haut resorbiert wird, andererseits, da ja Quecksilber schon bei Zimmertemperatur verdampft, es dampfförmig in der Luft ist und eingeatmet wird. Schulte hat sich eingehend mit der Art der Aufnahme des Quecksilbers beschäftigt. Er fand, daß bei Zahnärzten, die mit Handschuhen beim Amalgamreiben arbeiteten, dieselben Tageswerte der Quecksilbermenge im Harn gefunden wurden, wie bei solchen, die das Quecksilber ohne Handschuhe in der Hand verreiben. Es kann also daraus entnommen werden,

daß die Aufnahme durch die Lunge die größere Rolle spielt, während der Aufnahme durch die Haut keine oder nur geringe Wichtigkeit beizumessen ist.

Nach B i n f e g g e r variiert in Operationszimmern der Quecksilberdampf zwischen 0,0277 bis 0,948 mg pro cbm der Luft. Maßgebend ist ferner noch die Zeit, die der Zahnarzt sich in den quecksilberhaltigen Praxisräumen befindet. Je kürzer der Aufenthalt, desto geringer natürlich die aufgenommene Menge. Bei B i n f e g g e r variierten die Harnanalysen zwischen 0,023—0,078 mg bzw. 0,036—0,246 mg pro 4 l. Harn. Diese Ergebnisse decken sich ungefähr mit den Ergebnissen von S c h u l t e, dessen Werte sich auch um 0,05 bis 0,16 mg bewegten. Jedoch muß man bedenken, daß das Quecksilber zum Teil im Speichel, Schweiß und hauptsächlich im Kot ausgeschieden wird. Im Kot ist es besonders schwer nachzuweisen, da es bei der Analyse durch die anderen, ebenfalls dort vorhandenen Schwermetalle überdeckt wird und sich deshalb mengenmäßig sehr schwer nachweisen läßt. Nur etwa 60% der tatsächlich vorhandenen Quecksilbermengen ist im Harn nachweisbar.

T h o l u k fand bei Untersuchungen der Berliner Schulzahnärzte und ihres Personals bei 98 Harnproben nur 4 negativ.

Überall, wo mit Quecksilber gearbeitet wird, hinterläßt es nach mehr oder weniger langer Zeit Schädigungen, deren Ausmaße verschieden sind. Also sind auch beim Zahnarzte Schädigungen zu erwarten, wenn er auch im Vergleich zu anderen Berufen mit geringeren Mengen arbeitet. Die Schädigung hängt auch wohl weniger von der an sich geringen Menge des aufgenommenen Quecksilbers als von dem Ablauf und der Geschwindigkeit der Wiederausscheidung und besonders der Empfindlichkeit des Körpers, der Disposition, ab. Meist kommt es nur zu leichten Vergiftungserscheinungen, als da sind: Allgemeine Mattigkeit, Arbeitsunlust, leichte Ermüdbarkeit, erhöhte Reizbarkeit, Schreckhaftigkeit, Schlaflosigkeit, allmähliche Abnahme der psychischen Leistungen, Schwindelgefühl und Nachlassen des Gedächtnisses in geringem Maße. Die chronische Quecksilbervergiftung ist stets anzunehmen, wo es zu einer Übererregbarkeit der Speicheldrüsen, durch starken Speichelfluß gekennzeichnet, kommt. Weitere Symptome sind Magendarmstörungen

und, soweit die Mundhöhle nicht in gepflegtem Zustande ist, Stomatitis mercurialis, Intentionszittern und kann sich bis zu Erethismus mercurialis und Polineuritis mercurialis steigern. Ferner kann es zu Haarausfall kommen. Jedoch sind derartig schwere Formen beim Zahnarzte nicht anzunehmen und weiter wie bis zu den Magendarmstörungen wird es nicht kommen, da schon durch die leichten Erscheinungen derselben dem Zahnarzte ein Arbeiten unmöglich gemacht wird. Somit wird er aus dem Bereiche der Quecksilberdampf enthaltenden Praxisräume kommen, abgesehen davon, daß jeder Zahnarzt sich heute der Tragweite des unachtsamen Arbeitens mit Quecksilber bewußt ist.

Er wird es vermeiden, Quecksilber in unkontrollierbarer Weise in den Praxisraum kommen zu lassen, sei es durch Ausdrücken des Amalgams mit den Fingern und Abschütteln der Quecksilberperlen auf den Fußboden oder in anderer Weise.

L ü d d i c k e fand in den Fällen, wo Quecksilber nachzuweisen war, eine Erhöhung der Lymphozyten mit konsekutiver Verminderung der Segmentkernigen. Er nimmt an, daß die Quecksilberwirkung dieser kleinsten Mengen auf Katalyse ähnlichen Vorgängen beruht, welche zur Reizung des lymphatischen Apparates führen.

Röntgenschädigungen.

Dauernde, unkontrollierbare Röntgenstrahlen sind für die Haut wie auch für den Körper eine sehr große Gefahr, auch, wenn die Dosen sehr gering ist. Jedoch kommen derartige Röntgenschädigungen heute bei Zahnärzten fast garnicht mit vor, da die Sicherheitsvorrichtungen an einem Röntgenapparat derartig sind, daß Unglücksfälle so gut wie ausgeschlossen sind. Die Abschirmung der Röhre schließt Verbrennungen aus. Ebenso sind elektrische Unfälle dadurch ausgeschlossen, daß die Röhre nicht mehr direkt an der Hochspannung angeschlossen ist. In früherer Zeit, als man sich über die Wirkungsweise der Röntgenstrahlen noch nicht so im klaren war, kamen Unfälle allerdings relativ häufiger vor. Dadurch, daß die Röntgenröhre nicht peinlichst abgeschirmt war, kam es zur akuten und chronischen Röntgendermatitis. Auch heute besteht

diese Gefahr insofern noch, wenn der Zahnarzt den Film während der Belichtung im Munde des Patienten selbst festhält.

Die Symptome eines akuten Röntgenekzems sind: Bläschen und Geschwürsbildung. Die Symptome einer chron. Röntgendermatitis sind: Sprödigkeit der Nägel und der Haut, Haarausfall, schwer beeinflussbare Risse, die allmählich tiefer werden und nicht heilen, Ekzeme der Haut, die durch das Arbeiten mit chemischen, antiseptischen und photographischen Flüssigkeiten verschlimmert werden. Bei weiter andauernder Schädlichkeit geht dieser Prozeß allmählich in die Tiefe, befällt Perioßt, Gelenke und Knochen. Es kommt durch die Unnachgiebigkeit der starren Haut zu Kontrakturen der Finger und schließlich zu karzinomatöser Entartung (verhorn. Plattenepithelkrebs), die allmählich dann den Verlust der Finger, der Hand und sogar des Armes zur Folge hat. Derartige schwerwiegende Folgen werden jedoch, wie bereits gesagt, durch die heutigen Schutzmaßnahmen vermieden.

Bei diesen chronischen Röntgenschädigungen fanden Schwarz und Siebenbrock eine erhebliche Änderung des quantitativen und qualitativen Blutbildes. Sie beobachteten eine Leukopenie (5300 bis 6000 Leukozyten), wobei besonders die neutrophilen, polymorphkernigen Leukozyten vermindert waren. In einigen Fällen fehlen die azidophilen Leukozyten, in anderen Fällen waren sie stark reduziert. Dagegen waren die Lymphozyten bis zu 3500 im cbmm³ vermehrt. Die roten Blutkörperchen wiesen keine Veränderung auf.

Aubertin fand im Gegensatz dazu eine Vermehrung der eosinophilen Leukozyten. Er führt die Blutveränderungen im allgemeinen auf die Zerstörung von polynukleären Leukozyten zurück.

Schädigungen des Nervensystems.

Das Nervensystem ist eines der labilsten Organe des menschlichen Körpers und reagiert auf geringe, dauernde Schädlichkeiten in starkem Maße. 72 von 140 Zahnärzten klagten nach Klein über nervöse Beschwerden.

Nervösität in irgend einer Form ist wohl die meistverbreitetste Berufskrankheit des Zahnarztes. Besonders Zahnärzte, die eine aus-

gedehnte Kassenpraxis haben, leiden sehr unter nervösen Störungen. Wenn planmäßig, sinnvoll und auf Erfolg gearbeitet wird, wird man auch durch größte Beanspruchung nicht nervös. Aber wohl wird man nervös, wenn bei der Arbeit Ruhe und Muße fehlen, wenn unrationell gearbeitet und alles in Hast und Eile erledigt wird. Wenn in dem Wartezimmer die Patienten warten, der Zahnarzt unproduktiv, wie Einlagen, um Zeit zu gewinnen, an Stelle von effektiver Behandlung, um die Aufgabe zu beenden, arbeitet, um die Menge der wartenden Patienten zu verringern.

Für größere technische Arbeiten und Operationen bedarf es einer täglichen Arbeitseinteilung. Der Zahnarzt ist nicht in der Lage, jeden Tag mehrere größere, die allgemeine Verantwortung übersteigende Arbeiten auszuführen, ohne daß seine Spannkraft diesen Anforderungen erliegen wird. Es werden sich Mißerfolge einstellen, die deprimierend wirken und somit zur Arbeitsunlust und Unbefriedigung führen. Notwendigerweise werden sich diese Mißerfolge bei Fortsetzen der unrationellen Tätigkeit häufen und somit kommt es zur Gefahr der Arbeitshemmung und Verantwortungsflucht.

Schon im Moment der Niederlassung sollte der Zahnarzt auf verschiedene physische und psychische Eigenschaften achten und Fähigkeiten und Anforderungen in eine gewisse Korrelation gebracht werden.

Eine gutgehende Kassenpraxis ist stets eine Massenpraxis, die zu Unsicherheit führen muß. Das Verantwortungsgefühl verlangt Qualitätsarbeit, die Massenpraxis verbietet dieselbe und führt zu flüchtigem Arbeiten. Abgesehen davon, daß dem Patienten mit schlechter Arbeit nicht gedient ist, kommt es bei dem Zahnarzt zu einem Gefühl der Unsicherheit und Überreiztheit.

Hentze führt noch andere Schädlichkeiten an, die die Nervenkraft des Zahnarztes angreifen. Da ist:

1. Die Nervenenergie, die der Zahnarzt während seiner Berufstätigkeit aufbringen muß, um alle Klagen und Wünsche krankhaft erregter Patienten mit geduldiger Ruhe anzuhören, sich auf sie individuell einzustellen, plötzliche Ent-

schlüsse zu fassen, sich selbst stets beherrschen und das Verantwortungsgefühl für alle seine Maßnahmen.

2. Plötzliches Umstellen von einem Gebiete der Zahnheilkunde auf das andere, von mechanischer Handlung auf geistige Überlegung.
3. Die große Hast bei den Arbeiten, besonders in Krankenkassenpraxen, und die oft recht lange Arbeitszeit ohne genügende Pausen.
4. Die kohlen säurehaltige oft auch phenol- und quecksilberhaltige Luft im Behandlungsraum.

Die durch alle diese Punkte hervorgerufene Nervenschwäche (Neurasthenie) die einmal eine Hypofunktion und andererseits auch eine Hyperfunktion sein kann, steigert sich bis zur allgemeinen Nervenerkrankung, der Neurose, Hypertonie und Hypochondrie.

Diese Neurose ist nach Heinrich eine funktionelle Nervenkrankung ohne besondere anatomische Veränderungen. Geht sie nicht auf tatsächliche Überanstregung, Trauma, Gelenkerkrankung oder auch Rheumatismus zurück, dann ist sie rein psychisch bedingt und im Sinne einer lokalen Neurasthenie als seelischer Einspruch gegen die Berufsausübung aufzufassen. Nur solche Zahnärzte, die an Nervösität oder Minderwertigkeitsgefühlen leiden, werden von diesen Neurosen befallen.

In verschiedener Art tritt diese Neurasthenie zutage. Z. B. kann jede Sicherheit der Diagnofestellung verloren gehen und zum Zurückschrecken vor den geringsten therapeutischen Maßnahmen führen. Ferner in unbegründeten Angstzuständen und Scheu vor der Infektion. Diese Angstzustände können sich äußern in Platzangst, Angst vor Gas, Diebstahl, vor Verwechslung mit Medikamenten usw.

Henke schildert den tragischen Fall eines Zahnarztes, der nervöse Angst vor Blut bekam und dadurch seine wohlhabende Praxis ruinierte, statt sich in ärztliche Behandlung zu begeben.

Ferner ein typisches Zeichen von Diebstahlsangst erzählt er von einem Kollegen, der nachts 8—10 mal aufstand, um seinen Zahn- und Goldbestand zu kontrollieren. Eine vierwöchentliche Arbeits-

ruhe und eine geregelte Lebensweise heilten ihn sofort von seinem Leiden.

Trüb konnte zeigen, daß mit Lues infizierte Ärzte häufig an Tabes und Paralyse erkrankten. Da der Arzt die Gefahren der Syphilis kennt, ist er, wenn er sich damit infiziert weiß, in depressiver und verzweifelter Stimmung. Wie bei allen geistigen Berufen, so ist auch beim Arzt das Gehirn das angestrenzte Organ, muß also die Syphilis nach der Edinger'schen Theorie, wonach die Schädlichkeit stets am meist beanspruchten Organ angreift, gerade hier angreifen, also Tabes und Paralyse hervorrufen.

Außer dieser allgemeinen Neurasthenie kommt es bei labilen Zahnärzten auch zur lokalen Neurasthenie. Sie leiden zugleich an Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und hypochondrischen Verstimmungen. Man findet dabei manchmal eine Druckempfindlichkeit der zuleitenden Nervenstämmе. Tholuk stellte die Folgeerscheinungen dieser psychisch bedingten Neurosen zusammen. Es beginnt mit leichter Ermüdbarkeit, daraufhin verminderte Leistungsfähigkeit. Unlustgefühl in Bezug auf die Fertigstellung begonnener Arbeiten. Kopfschmerz und Kopfdruck.

Schwere Symptome der Nervener schöpfung sind Schwindelgefühl und Tremor, Depressions- und Angstgefühle, Reizbarkeit und mißmutiges Wesen gegen Personal und Patienten. Ferner Schlaflosigkeit und Herzbeschwerden jeder Art. Dazu gesellen sich die verschiedensten Äußerungen der einzelnen Organe.

Nervöse Magenbeschwerden, die sich in Vollgefühl, Magenschmerzen, Druck und Angstgefühl in der Magengegend äußern. Aufstoßen bei gefülltem oder leeren Magen. Habituelle Obstipation, nervöse Diarrhoen, anderseits Harndrang, nervöse Harnhaltung.

Bei Zahnärztinnen findet man dismenorrhöische Beschwerden.

Ebenfalls eine nervöse Schädlichkeit dürfte die von Hentze genannte Pseudologia phantastica sein.

Bei Zahnärzten mit einem psychischen Insult, durch den sie eine vermeintliche Zurücksetzung erfahren zu haben glaubten, äußert sie sich in Übertreibung des Umfanges und der Einnahmen

der Praxis. Bei jüngeren Zahnärzten in Minderwertigkeitsgefühlen und Scheu vor Verantwortung.

Schädigungen durch Syphilis.

Nach Hentze fand Trüb in der Literatur 338 eindeutige Fälle von Berufssyphilis an Händen und Fingern von Ärzten. Darunter befanden sich 16 Zahnärzte = 4,7%. Bei einer auf diese Weise entstandenen Syphilis spricht man von einer Syphilis der Unschuldigen oder nach Kantorowicz: *Syphilis technica passiva*.

Meist tritt die Infektion an den Fingern auf. Scheurer und Almquist veröffentlichten 18 Fälle von syphilitischer Berufsinfektion bei Zahnärzten. Davon waren 14 Fälle an den Fingern, meist erworben durch schon vorhandene Wunden oder durch Verletzung mit Instrumenten oder Biß des Patienten.

In jedem Falle eines schlecht heilenden Panaritiums muß der Zahnarzt an eine syphilitische Infektion denken. Ist es zu einer solchen Infektion gekommen, so sind die ersten weiteren bedrohlichen Anzeichen Exantheme an der Seite des Stammes und in der Ellenbogenbeuge. Durch die Überschwemmung des Körpers mit Spirochäten kommt es dann zu den typischen Allgemeinerscheinungen: Blässe, Kopfschmerzen, Herzklopfen, Knöcheloedeme, Neuralgien, besonders des Trigeminus und der Interkostalnerven, Knochen-schmerzen am Scheitel, Brustbein und den Innenflächen des Schienbeins. Stets muß der Zahnarzt daran denken, daß der Luetiker nicht nur infektiös mit seinem Blute ist, wenn er sichtbare,luetische Stellen im Munde und an der Lippe trägt, sondern auch jederzeit, wenn in den langen Latenzzeiten der Krankheit nur die Spirochäten im Munde kreisen. Blutspritzer an die Lippe oder in die Augen genügen, um im ungünstigen Falle einen Primäraffekt hervorzurufen. Ferner kann eine sekundäre Übertragung mittels des infizierten Fingers oder durch Anhusten von einem Luetiker an eine andere Körperstelle stattfinden. Bekannt sind die Stellen am Augenlid, Kinn und Wange.

Schädigungen des Auges.

Groß sind die Gefahren, denen die Augen des Zahnarztes während der Berufsausübung ausgesetzt sind. Durch abspringende Partikel beim Beschleifen eines Zahnes oder bei unvorsichtigem Umgehen mit Medikamenten, durch Hineinspritzen von Infektionsstoff aus dem Munde des Patienten kann es zu einer Konjunktivitis und darauf zur stärkeren, entzündlichen Mitbeteiligung der inneren, empfindlichen Augenteile, der Regenbogenhaut und des Augeninneren kommen. Selbst schwere Hornhautgeschwüre mit Verlust der Sehkraft sind beobachtet worden. F a u f t berichtet von einem solchen Falle, wo bei einem Zahnarzte nach einer Verletzung eine Konjunktivitis mit gleichzeitiger Iridocyclitis auftrat, die den Zahnarzt arbeitsunfähig machte.

K l ö f e r berichtet von einem Zahnarzte, der von einem Tuberkulösen angehustet wurde. 24 Stunden später hatte er eine eitrig-tuberculöse Konjunktivitis, die erst 3 Monate später nach einer energischen Behandlung mit Höllensteinlösung und gleichzeitiger Tuberculineinreibung verschwand.

Die anhaltende Arbeit am kleinen, schwer einwandfrei zu beleuchtendem Objekte erfordert ein Übermaß an Anstrengung. Bei Nahsehen sind es besonders die Musc. ciliares des Auges, die beansprucht werden und deren dauernde, höchste Anspannung zu Kurzsichtigkeit führen kann. Weiter gefährdet sind die Musc. recti interni, die die Konvergenzbewegungen der beiden Augen auf einen Nahpunkt richten.

S t a n k o v i c spricht von einer typischen, zahnärztlichen Augenerkrankung, der sogen. progressiven Amblyopia ex anopsia. Bei verschiedenem Brechungsvermögen der beiden Augen kommt es zu einem Strabismus des rechten Auges und langsamer Beschränkung (nicht Aufhebung) des Sehvermögens. Besonders soll dieser Zustand bei jahrelanger, fortgesetzter Goldarbeit, noch dazu bei Spiegelbenutzung unter bevorzugter Verwendung eines Auges, hervortreten.

Sehr schädlich für das Auge ist ferner die meist sehr mangelhafte Beleuchtung im Munde. Bei Verwendung von Mundlampen

folllen diese nach Möglichkeit abgeblendet werden, um ein Blenden des Auges zu vermeiden. Erwähnt findet man auch die sogen. Goldblindheit infolge längeren Arbeitens mit Gold. Auch dies beruht auf Blendung des Auges, d. h. einer Überreiztheit der Netzhaut. Bei Wechsel der Arbeit verschwindet diese Überreiztheit.

Panaritien.

Recht häufig entstehen durch Verletzungen mit Sonden, beim Ausrutschen mit dem Bohrer kleine infektiöse Prozesse an den Fingern, die sogen. Panaritien.

Meist kommt es durch die schnelle Leukozytenansammlung zu nur kleinen, lokalen Prozessen. Gelangen aber virulente Streptokokken bei einer Verletzung in die Tiefe der Finger in eine Sehnen Scheide, so kommt es schnell zu der gefürchteten Sehnen Scheidenphlegmone. Der ganze Finger schwillt schnell an, am nächsten Tage besteht meist schon eine Schwellung der Hohlhand, dann des Unterarmes, da die Sehnen Scheiden der Hohlhand unter den Bändern des Handgelenkes hindurch bis an den Unterarm hinaufreichen. Nur rasches Zugreifen des Chirurgen mit großen, Luft schaffenden Incisionen, wie F a u s t bemerkt, schafft Hilfe.

Schlußwort.

Zusammenfassend kann man sagen, daß bei allen diesen Schädlichkeiten eine direkte Hilfe nur zu erwarten ist, wenn der Zahnarzt sich peinlichst hütet, in Berührung mit der auslösenden Ursache zu kommen.

Beim Ekzem sind es die Medikamente, mit denen der Zahnarzt täglich arbeitet, wie Novocain, Formalin usw. Auf Grund des klinischen Bildes dürfte es im allgemeinen nicht immer möglich sein, mit Sicherheit das auslösende Agens zu bestimmen. Es wird stets Aufgabe des Facharztes sein, in langwieriger, systematischer Untersuchung herauszufinden, welches Mittel ekzematogen ist.

Die Schädigungen des Bewegungsapparates zu umgehen, dürfte schwieriger sein, da die Entstehung derselben auf einer falschen Haltung beim Arbeiten beruht, die meist durch die Gewohnheit diktiert und damit auch unbewußt sein dürfte. Da sich die beginnende Ermüdung der betroffenen Muskelgruppen vor dem endgültigen Zuspatfein bemerkbar macht, sollte der Zahnarzt diese Warnzeichen nicht unberücksichtigt lassen und sich durch Wechsel der Körperhaltung und Arbeitsmethode sowie zeitweiligen Übergang von der stehenden zur sitzenden Arbeitsweise vor schweren Schädigungen seines Bewegungsapparates schützen.

Quecksilberschädigungen lassen sich in jedem Falle im zahnärztlichen Beruf verhüten. Pellkoffer schlägt vor, mit einem Dosierapparat die jeweils nötige Quecksilbermenge festzustellen. Ferner ein zur Hälfte mit Wasser gefülltes Standglas zu gebrauchen, dessen Deckel in der Mitte eine offene, trichterförmige Vorrichtung hat, in die etwaige Abfälle geschüttet werden und damit von Wasser bedeckt sind.

Röntgenschädigungen zu vermeiden, heißt: sich vor Röntgenstrahlen hüten.

Die Schädigungen des Nervensystems zu umgehen, ist für den Zahnarzt ebenfalls nicht ganz einfach, da die Ursache meist ein kleines aber vieles ist, ferner auch so wechselnd ist, daß ein Vermeiden derselben nur in rationellster und peinlichster Arbeitsleistung und Arbeitseinteilung sowie vieler Ruhe und Erholung

liegt. Vorschläge, die auch zur Vermeidung der Schädigungen des Auges neben dem evtl. Tragen einer Arbeitsbrille ihre Berechtigung haben.

Nach Brunft leiden 20% der Zahnärzte an Herzkrankheiten und 10,3% an Apoplexie. Diese Zahlen geben zu denken und es erhebt sich die Frage, ob es überhaupt möglich ist, diese Schädlichkeiten zu vermindern resp. zu beseitigen.

Brunft meint dazu folgendes: Die verausgabte Arbeitsenergie hängt nicht nur von der absoluten Größe der Arbeit ab, sondern auch in erster Linie von der zeitlichen Verteilung. Nicht nur das Arbeitsquantum, sondern auch der Arbeitsrythmus muß der Arbeitsfähigkeit angepaßt sein. Deshalb besteht die richtige Arbeitsweise des Zahnarztes darin, in einer bestimmten Zeiteinheit nicht mehr Energie zu verausgaben, als der Organismus ohne dauernde Schädigung leisten kann. Dies ist nur zu erreichen durch strengste Zeiteinteilung, Durchführung des Achtstundentages. Eine weitere Forderung besteht im Sporttreiben. Dies ist unbedingt nötig, um die schlechte Körperhaltung zu kompensieren, die Lunge zu kräftigen. Es kommen da vor allem in Frage Boxen und Rudern. Jeden Morgen etwas Gymnastik.

Weiterhin müßte der Zahnarzt jedes Jahr drei Wochen Ferien machen. Gerade dieses Ausspannen ist dringend notwendig und in diesem Punkte sollte sich der Zahnarzt möglichst wenig von geldlichen Überlegungen beeinflussen lassen.

Die hauptsächliche Forderung aber ist: Hygiene und Schönheit des Arbeitsplatzes. Es muß Freude machen, das blitzend saubere Sprechzimmer zu betreten.

Sollte sich aber doch eine Schädlichkeit vermuten lassen oder herausstellen, dann begeben man sich sofort zum Facharzte. Nie aber soll man versuchen, sich selbst zu kurieren. Es wird dadurch meist nur schlimmer und damit langwieriger.

Schrifttum.

1. Klein, B.: „Die Berufskrankheiten des Zahnarztes“. Zahnärztl. Rundschau 1991 Nr. 31.
2. Löwy: „Zur Prophylaxe der Berufskrankheiten.“ Mediz. Klinik 1925 Nr. 25 und 1926 Nr. 15 u. 16.
3. Heinrich: „Unfere Patienten und Wir.“ Verlag Lehmann, München.
4. Jadassohn: „Bemerkungen zur Sensibilisierung und Defensibilisierung bei den Ekzemen im Anschluß an einen Fall von Odolekzem.“ Klin. Wochenschrift 1923 Nr. 36, 37/38.
5. Bloch: „Pathogenese des Ekzems.“ Arch. für Dermat. 1923/24, Bd. 144/45.
6. — „Über Berufsdermatosen mit spez. Berücksichtigung des Berufsekzems.“ Schweiz. Med. Woch. 1925 Nr. 5.
7. Sachs: „Gewerbliche Dermatosen.“ Dermatol. Wochenschr. 1923 Nr. 26a S. 582.
8. Norgauer: „Das Berufsekzem.“ Zahnärztl. Rundschau 1930 Nr. 2.
9. v. Wurm: „Hauterkrankungen beruflicher Art an den Händen von Zahnärzten. Deutsche zahnärztl. Wochenschrift 1934 Nr. 1.
10. v. Deinfel: Misch 6. Band/2. Seite 942.
11. Misch: „Grenzgebiete der Zahnheilkunde.“ 1926.
12. Lane: „Occupational dermatitis in dentists: susceptibility to Procain.“ Ref. im Zentralbl. f. Haut- und Geschlechtskr. 1921/1.
13. Smelow: „Über einen Fall von Novoc.-Dermatitis.“ Zentralbl. f. Haut- und Geschlechtskr. 1930 Bd. 32.
14. Carreras: „Novocaindermatitis.“ Zentralblatt f. Haut- und Geschlechtskr. 1933 Bd. 43.
15. Jordan: „Über Novoc.-Ekzeme.“ Zentralbl. f. Haut- u. Geschlechtskrankh. 1928 Bd. 25.
16. Tholuk: „Eine neue Berufskrankheit?“ Zahnärztl. Mitteil. 1928 Nr. 28.
17. Wolters: „Über eine Berufsdermatose bei Zahnärzten, hervorgerufen durch Trikesolformalin.“ Deutsche zahnärztl. Wochschr. 1913 Nr. 10.
18. Galewski: „Über berufl. Dermatosen.“ Münch. med. Wochschr. 1905 Bd. 1.
19. Hoelzer: „Fingerekekzeme.“ Zahnärztl. Rundschau 1913 Nr. 3.
20. Kopytowski: „Beitrag zu den patholog. Veränderungen der Haut unter der Einwirkung von Formalin.“ Ref. Derm. Woch. 1927 Nr. 85.
21. Brähler: „Über das Berufsekzem der Zahnärzte.“ Zahnärztl. Rundschau 1930 Nr. 5.

22. Kl ö f e r : „Zahnärztl. Berufskrankheiten.“ Zahnärztl. Rundschau 1935
Nr. 2 und 3.
 23. Tr ü b : „Die Syphilis als Berufskrankheit des Arztes.“ Dissert. Bonn
 24. M o s e n t h a l : „Die Berufskrankheiten des Zahnarztes.“ Zahnärztl.
Rundschau 1930 Nr. 15 u. 16.
 25. P l a t e : „Taschenbuch des Feldarztes.“
 26. F a u s t : „Berufschädigungen des Zahnarztes und ihre Prophylaxe.“
Deutsch. Zahnärztl. Wochr. 1925 Nr. 3.
 26. B o r i n s k i : „Die Gefahren des Quecksilbers in der zahnärztl. Praxis“
Städt. Gesundheitsamt Berlin 1930.
 27. S c h u l t e : „Über die Gefahr einer Quecksilbervergiftung bei Zahn-
ärzten.“ Archiv f. Hygiene Bd. 83 H. 1/2 43.
 28. B i n s e g g e r : „Zahnärztliche Rundschau 1928“
 29. L ü d d i c k e : „Einwirkung minimaler Quecksilbermengen auf das Dif-
ferentialbild.“ Zahnärztl. Rundschau 1928.
 30. H e n t z e : „Die Berufshygiene des Zahnarztes.“ Deutsche zahnärztl.
Wochenschrift 1924 Nr. 12.
 31. S c h e u r e r u n d A l m q u i s t : „Die Syphilis der Unschuldigen.“
 32. S t a n k o v i k : „Eine Krankheit der Zahnärzte.“ Wochr. f. Hygiene
des Auges 1903.
 33. K a n t o r o w i c z : „Handwörterbuch der gesamten Zahnheilkunde.“
Bd. 1
 34. P e l l k o f e r : „Sparen das Gebot der Stunde.“ Z. M. 1936 Nr. 49.
-

Lebenslauf.

Ich, Werner S c h u l z , wurde am 20. Juli 1911 als Sohn des Adolf S c h u l z und seiner Ehefrau Frieda geb. Möbus zu Köln geboren. Nach 13jährigem Besuch des Städt. Realgymnasiums in Bonn legte ich Ostern 1930 die Reifeprüfung ab. Nach 2 Semestern Theologiestudium an der Rhein. Friedrich-Wilhelm-Universität wechselte ich das Studiumfach und studierte Zahnheilkunde an derselben Universität. Das zahnärztliche Vorexamen bestand ich im Juli 1932 in Bonn. Das zahnärztliche Staatsexamen bestand ich am 20. November 1934, ebenfalls in Bonn und erhielt gleichzeitig die Approbation als Zahnarzt.
